

ILUSTRACE – POKYNY K POUŽITÍ

1. Vyměte sáček s náplastí, otevřete jej a vyjměte náplast.
2. Náplast přiložte na bolavé místo.
3. Odstraňte nejpozději po 24 hodinách.

Před použitím náplasti na bolest: AlgyL CBD si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Náplast na bolest AlgyL CBD je registrovaný zdravotnický prostředek. Jeho účinnost a bezpečnost byly testovány v souladu s nařízením (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

CO JE NÁPLAST NA BOLEST ALGYL CBD A JAK PŮSOBÍ?

Náplast na bolest je zdravotnický prostředek, který se aplikuje zevně na pokožku v oblastech bolavých kloubů nebo svalů. Má dva hlavní účinky: Zaprvé má rychlý chladivý účinek – rozpouštědla v náplastí se rychle odpařují, čímž na ošetřované pokožce vzniká pocit ochlazení. Zadruhé dochází ke stimulaci nervů a svalů pod náplastí, a tím k delší úlevě od bolesti. Díky této stimulaci se lépe prokrvují svaly, což přináší dlouhodobou úlevu od bolesti.

ÚČEL POUŽITÍ

Má chladivý účinek a napomáhá úlevě od bolesti svalů a kloubů.

VÝHODY POUŽITÍ

Zmírňuje bolest. Poskytuje dlouhodobou úlevu od bolesti. Proti bolesti svalů, krku, zad a ramen a bolesti při výronech, sportovních úrazech a artritidě.

POUŽITÍ

Náplast přiložte na čistou a suchou pokožku na ošetřovaném místě. Roztrhněte sáček a vyjměte náplast. Odstraňte ochrannou vrstvu a náplast umístěte na bolavé místo. Náplast používejte pouze jednou denně a nenechávejte ji na těle déle než 24 hodin. Náplast nepřikládějte na poraněnou ani podrážděnou pokožku (např. pořezanou, poškrábanou, spálenou od slunce, infikovanou nebo s vyrážkou). Dodržujte veškeré pokyny na obalu výrobku. Výrobek je určen pro dočasné používání.

SLOŽENÍ:

Aktivní složka: 94,4 % akrylové lepidlo. Pomocné látky: kanabidiol (CBD), mentol a tekutý výtažek z arniky. Náplast obsahuje alkohol.

ZPŮSOB DÁVKOVÁNÍ A OBSAH

Původní balení s 8 náplastmi.

UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro lokální použití.
- Zabráňte styku s očima.
- Pokud po 2–3 dnech používání náplasti nedojde ke zlepšení nebo pokud se příznaky výrazně zhorší, poraďte se s lékařem.

LÉKOVÁ INTERAKCE

Abyste nedocházelo ke vzájemnému působení s léky, užívejte léky v rozmezí dvou hodin nebo se poraďte s lékařem.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Při používání dle pokynů, nejsou žádné vedlejší účinky známy.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte v případě hypersenzitivity (alergie) na kteroukoli složku.

POKYNY K UCHOVÁVÁNÍ

- Uchovávejte v chladu (10 °C–25 °C) a temnu.
- Sáček po použití pevně uzavřete.
- Náplast se smí používat pouze do data spotřeby uvedeného na krabici / sáčku. Pokud už datum spotřeby uplynulo, výrobek se nesmí používat.
- Vzhledem ke složení výrobku se po určité době může objevit lehké růžové zabarvení. Kvalita výrobku tím však není ovlivněna.

LIKVIDACE

- Výrobek lze likvidovat s běžným domovním odpadem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat.
- Bez konzultace s lékařem se nedoporučuje pro děti mladší 14 let.
- V těhotenství či během kojení používejte výhradně po konzultaci s lékařem.
- Tento výrobek nepoužívejte na poškozené ani poraněné po-kožce.
- Po použití si důkladně umyjte ruce.
- Výrobek nesmějí používat osoby s alergií na alkohol, roz-pouštědla a ostatní uvedené složky.

NAHLAŠOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Je-li tento výrobek spojen se závažnou událostí (úmrtí pacienta, uživatele či jiné osoby; dočasně nebo trvale zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele či jiné osoby; vážné ohrožení veřejného zdraví), musí být tato událost nahlášena výrobcí a příslušným státním orgánům.

	Zdravotnický prostředek		Viz návod k použití
	Rozsah teplot		Kód dávky
	Chraňte před slunečním zářením.		Datum spotřeby
	Výrobek nepoužívejte, je-li obal porušený.		Nepoužívejte opětovně
	unique device identifier		

Návod k použití náplasti na bolest

Návod na použitie náplasti proti bolesti

ILUSTRACE – POKYNY K POUŽITÍ

1. Vyměte sáček s náplastí, otevřete jej a vyjměte náplast.
2. Náplast přiložte na bolavé místo.
3. Odstraňte nejpozději po 24 hodinách.

Před použitím náplasti na bolest: AlgyL CBD si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Náplast na bolest AlgyL CBD je registrovaný zdravotnický prostředek. Jeho účinnost a bezpečnost byly testovány v souladu s nařízením (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

CO JE NÁPLAST NA BOLEST ALGYL CBD A JAK PŮSOBÍ?

Náplast na bolest je zdravotnický prostředek, který se aplikuje zevně na pokožku v oblastech bolavých kloubů nebo svalů. Má dva hlavní účinky: Zaprvé má rychlý chladivý účinek – rozpouštědla v náplastí se rychle odpařují, čímž na ošetřované pokožce vzniká pocit ochlazení. Zadruhé dochází ke stimulaci nervů a svalů pod náplastí, a tím k delší úlevě od bolesti. Díky této stimulaci se lépe prokrvují svaly, což přináší dlouhodobou úlevu od bolesti.

ÚČEL POUŽITÍ

Má chladivý účinek a napomáhá úlevě od bolesti svalů a kloubů.

VÝHODY POUŽITÍ

Zmírňuje bolest. Poskytuje dlouhodobou úlevu od bolesti. Proti bolesti svalů, krku, zad a ramen a bolesti při výronech, sportovních úrazech a artritidě.

POUŽITÍ

Náplast přiložte na čistou a suchou pokožku na ošetřovaném místě. Roztrhněte sáček a vyjměte náplast. Odstraňte ochrannou vrstvu a náplast umístěte na bolavé místo. Náplast používejte pouze jednou denně a nenechávejte ji na těle déle než 24 hodin. Náplast nepřikládějte na poraněnou ani podrážděnou pokožku (např. pořezanou, poškrábanou, spálenou od slunce, infikovanou nebo s vyrážkou). Dodržujte veškeré pokyny na obalu výrobku. Výrobek je určen pro dočasné používání.

SLOŽENÍ:

Aktivní složka: 94,4 % akrylové lepidlo. Pomocné látky: kanabidiol (CBD), mentol a tekutý výtažek z arniky. Náplast obsahuje alkohol.

ZPŮSOB DÁVKOVÁNÍ A OBSAH

Původní balení s 8 náplastmi.

UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro lokální použití.
- Zabráňte styku s očima.
- Pokud po 2–3 dnech používání náplasti nedojde ke zlepšení nebo pokud se příznaky výrazně zhorší, poraďte se s lékařem.

LÉKOVÁ INTERAKCE

Abyste nedocházelo ke vzájemnému působení s léky, užívejte léky v rozmezí dvou hodin nebo se poraďte s lékařem.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Při používání dle pokynů, nejsou žádné vedlejší účinky známy.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte v případě hypersenzitivity (alergie) na kteroukoli složku.

POKYNY K UCHOVÁVÁNÍ

- Uchovávejte v chladu (10 °C–25 °C) a temnu.
- Sáček po použití pevně uzavřete.
- Náplast se smí používat pouze do data spotřeby uvedeného na krabici / sáčku. Pokud už datum spotřeby uplynulo, výrobek se nesmí používat.
- Vzhledem ke složení výrobku se po určité době může objevit lehké růžové zabarvení. Kvalita výrobku tím však není ovlivněna.

LIKVIDACE

- Výrobek lze likvidovat s běžným domovním odpadem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat.
- Bez konzultace s lékařem se nedoporučuje pro děti mladší 14 let.
- V těhotenství či během kojení používejte výhradně po konzultaci s lékařem.
- Tento výrobek nepoužívejte na poškozené ani poraněné po-kožce.
- Po použití si důkladně umyjte ruce.
- Výrobek nesmějí používat osoby s alergií na alkohol, roz-pouštědla a ostatní uvedené složky.

NAHLAŠOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Je-li tento výrobek spojen se závažnou událostí (úmrtí pacienta, uživatele či jiné osoby; dočasně nebo trvale zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele či jiné osoby; vážné ohrožení veřejného zdraví), musí být tato událost nahlášena výrobcí a příslušným státním orgánům.

	Zdravotnický prostředek		Viz návod k použití
	Rozsah teplot		Kód dávky
	Chraňte před slunečním zářením.		Datum spotřeby
	Výrobek nepoužívejte, je-li obal porušený.		Nepoužívejte opětovně
	unique device identifier		